

Совет тифлопедагога: «Признаки возможного нарушения зрения, при котором ребенка надо показать окулисту»

- Если вы видите, что ребенок часто жмурится и плотно закрывает веки – возможны воспалительные процессы в зрительном анализаторе, падение остроты зрения.
- Симптомы повреждения роговицы глаза, воспаления, синдром сухого глаза, светобоязнь проявляются тем, что у ребенка часто бывают покрасневшие, слезящиеся глаза, он избегает смотреть на свет.
- При миопии (близорукости) наблюдаются следующие признаки: ребенок низко склоняется над столом, когда рисует или читает, старается сесть ближе к телевизору, рассматривает предметы и картинки с очень близкого расстояния.
- Если ребенок щурится, глядя на предметы, то таким образом он пытается улучшить качество картинки, что характерно для прогрессирующей гиперметропии (дальнозоркости) или миопии.
- При нарушении бинокулярности (одинаковое видение двумя глазами глубины и объема, при котором информация из обоих глаз складывается в одну картинку) зрения может часто спотыкаться и ронять предметы.
- При нарушении поля зрения наблюдая за чем то, постоянно склоняет голову набок.
- При гиперметропии тянется к удаленному предмету, а взяв его в руки, теряет к нему интерес.
- Так же на нарушение зрения указывает то, что при одинаковом освещении ребенок по-разному воспринимает цвета и размеры игрушек.
- Обращайте внимание на косоглазие, даже если оно едва заметно или проявляется время от времени, так как оно является причиной амблиопии (снижения зрения), отсутствия бинокулярного зрения.